



## Kritische Extremitätenblutung

Anlage Tourniquet  
ca. handbreit proximal der Wunde

Festziehen bis Blutung steht

Blutung  
steht?

nein

2tes Tourniquet  
Erwägen  
(proximal des 1ten)

ja

Weiteres Vorgehen  
gem. ABCDE-Algorithmus

Blutung  
steht?

ja

nein

zeitkritischer  
Transport



## **Indikation Tourniquet:**

- Amputationsverletzung großer Gliedmaßen
- Lebensbedrohliche Extremitätenblutung
- Extremitätenblutung bei gleichzeitigem A-, B- oder C-Problem
- Keine Erreichbarkeit der Verletzung (z.B. eingeklemmte Person)
- Unmöglichkeit der Blutstillung durch andere Mittel und Maßnahmen
- Versorgung der Blutstillung bei Dunkelheit
- Schwere Extremitätenblutung bei MANV (GSE)
- Bei Zeitdruck in Gefahrenlagen oder extremen Situationen (taktische Medizin)

## **Orte für präklinische Anlage eines Tourniquet:**

- In taktischen Situationen, Gefahrensituationen, bei Dunkelheit, multiplen Blutungen an einer Extremität, MANV, und offenen Frakturen so proximal wie möglich auf der Kleidung (nahe am Körperstamm)
- Sonst so distal wie möglich - jedoch ausreichend proximal (handbreit/5-10 cm) der Blutungsquelle direkt auf der Haut
- Nicht über Gelenken
- Nicht über Wundtaschen, Fremdkörper und offenen Frakturen