

## Borreliose



Et ass rëm Saison vun de Bëschzecken, a si kënnen Krankheeten iwwerdroen, virun allem Borreliose.

Dëst ass eng bakteriell Infektioun, déi duerch den Zeckebass iwwerdroe gëtt.

Et gëtt nach keen Impfstoff géint Borreliose an och keng Immunitéit géint d'Krankheet, et kann een sech also puer Mol mat Borreliose infizéieren.

Borreliose ass net ze verwiessele mat der FSME (Frühsommermeningoenzephalitis), déi et an eiser Regioun nach net gëtt.

### Symptomer

-2-30 Deeg nom Zeckebass

Un der Bassplaz kann eng rankfërmeg Routfierung vun der Haut optrieden:  
den ERYTHEMA MIGRANS



Borreliose huet onspezifesch Symptomer, wat hier Diagnos erschwéiert.

Dozou gehéiere Middegheet, Féiwer a Kappwéi

-Woche bis Méint nom Zeckebass

- Hirnhautentzündung, hallefsäiteg Gesichtsblämung
  - Arthritt
- Hærmuskelentzündung mat Hærrhythmusstéierungen a Wéi op der Broscht
  - Verännerunge vun der Haut

-méi wéi 6 Méint nom Zeckebass

- Arthritt
- Schiedegunge vum Gehier a vum Réckemuerch (Kribbelen an de Fanger)
  - Verännerunge vun der Haut: Pergamenthaut

### Diagnos a Behandlung

D'Fréierkennung baséiert op klinesch Symptomer, wéi z.B. dem Erythema migrans.

No der Diagnos soll sou séier ewéi méiglech eng Antibiotikatherapie gemaach ginn. 2–6 Wochen no der Infektioun treden och am Blutt Antikierper op.

### Schutzmoossnamen

- Hell Kleeder mat laangen Äerm a laang Boxen am Beschten an d'Strëmp gestach
- Kierper ofsichen nom Openthalt an der Natur (Zecke setze meeschtendeels um Kapp, bei den Oueren an an de Hoer, um Hals, an der Knéikälchen oder am Intimberäich.
  - > Bei weideren Froen, kënn der lech gäer am STP mellen

